

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
อำเภอองาว จังหวัดลำปาง 52110

ยุงลายแมลงร้าย ที่กัดตำบรพที่ข่มมุขย ได้

www.banhang.go.th

Telephone number : 054-261-552




THANK YOU

EMAIL

bannhang@hotmail.com

ADDRESS

241 หมู่ 3 ตำบลบ้านแหง อำเภอองาว จังหวัด
ลำปาง 52110



โรคไข้เลือดออกในเด็ก





Vibhavat

• ยุงลายแมลงร้าย ตึกดำบรรพ์ที่ยามมนุษย์ได้

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาใหญ่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย ขณะพบว่ามีภาระบาดอยู่ทั่วไปแทบทุกจังหวัด รองลงมาคือภาคใต้ ภาคเหนือและภาคอีสาน จนเกิดความเป็นห่วงกันว่าหากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่

ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอยประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่จะมีอาการหน้าแดงที่จุดแดงๆหรือจุดเลือดออกเล็กๆที่ แขน ขา รักแร้ และตามลำตัว บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ผู้ป่วยมีภาวะช็อกถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิตภายใน 12-24 ชั่วโมง

• การดูแลรักษาเมื่อเป็นไข้เลือดออก
โดยทั่วไปจะรักษาตามอาการและความรุนแรง ถ้าอาการไม่รุนแรงจะหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยาในการรักษา ในรายที่มีอาการรุนแรงให้รักษาตามอาการ ดังนี้
*** ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้ป้องกันการชกจากไข้สูง

*** หากจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามให้ยาแอสไพริน เพราะจะทำให้เส้นเลือดเปราะและแตกง่าย
*** ถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหรือขาดน้ำให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ
*** ให้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก นม น้ำหวาน

*** ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดถ้าเกิดอาการนำช็อกคือ ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็นรอบปากเขียวพร้อมๆกับไข้ลดลงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

• การป้องกันโรคไข้เลือดออก
*** สึกเสียงไม่ให้ยุงลายกัดโดยให้เด็กนอนกางมุ้งในเวลากลางวันหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดและอับชื้น

*** ทำลายยุง ด้วยการพ่นหมอกควันและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

*** ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย

- ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
- ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาทอง ปลานกยุงหรือปลากัดในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
- ทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว
- ใส่ทรายอะเบท เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฟอกลงในจานรองตู้กับข้าวหรือภาชนะที่มีน้ำขัง
- หมั่นตรวจดูลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทั้งในและนอกบ้านทุก 7 วัน ถ้าพบให้ทำลาย

ระบาดได้ อาจทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา

• การแพร่พันธุ์ของยุงลาย

ยุงลายเป็นยุงที่ไม่ชอบแสงแดดและลมแรง ดังนั้นจึงมักบินไปไม่เกิน 50-80 เมตร นอกจากนี้ยังพบว่ามียุงลายชุกชุมในฤดูฝน เพราะมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ ส่วนในฤดูอื่นๆพบความชุกชุมของยุงลายลดลงเล็กน้อย

• แหล่งที่อยู่ของยุงลาย

โดยทั่วไป ยุงลายจะอาศัยและวางไข่ในแหล่งน้ำที่ใสและนิ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะเก็บกักน้ำในสวนบ้านมากกว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

• อาการผู้ป่วยไข้เลือดออก

โดยทั่วไปจะรักษาตามอาการและความรุนแรง ถ้าอาการไม่รุนแรงจะหายเองได้ โดยไม่ต้องใช้ยารักษาในรายการที่มีอาการรุนแรงให้รักษาตามอาการดังนี้

- ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้และป้องกันการชกจากไข้สูง
- หากจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามให้ยาแอสไพริน เพราะจะทำให้เส้นเลือดเปราะและแตกง่าย
- ถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหรือขาดน้ำให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ
- ให้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก นม น้ำหวาน
- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดอาการนำช็อก คือ ปัสสาวะน้อย กระสับกระส่าย มือเท้าเย็นรอบปากเขียว พร้อมๆกับไข้ลดลง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

