

เก็บมาฝาก

เป็นการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆคือ เชื้อแดง
กี้(Dengue) และชิคุนงุยา(Chikungunya) มากกว่า
90% เกิดจากเชื้อตัวแรกโดยทั่วไปในการรับเชื้อครั้งแรก
มักไม่ค่อยมีอาการรุนแรงมากนัก ซึ่งสามารถเกิดในเด็กๆ
ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป


โรคไข้เลือดออกในเด็ก



พาหะ

- ยุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคยุงนี้จะกัด
คนที่เป็นโรคและไปกัดคนอื่นในรัศมี 400 เมตร ยุง
นี้ชอบแพร่พันธุ์ในน้ำนิ่ง หลุม โถง น้ำขัง อละจะออก
หากินในเวลากลางวัน(ช่วงเวลาประมาณ 09.00-
17.00 น.)

วงจรชีวิตยุงลาย



LAPANG.THAILAND

องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแหง

WWW.BAHNHANG.GO.TH

FACEBOOK: อบต.บ้านแหง อ.จาง



โรคไข้เลือดออก



ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

อาการของโรคไข้เลือดออก



มีไข้ขึ้นสูง

บางรายอาจมีไข้ขึ้นถึง 40 องศา



มีอาการปวดเมื่อย

ปวดหัว ปวดตัว ปวดกระดูก
ปวดตา ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ



อาจมีอาการตับอักเสบ

อาจมีอาการปวดท้อง
บริเวณลิ้นปี่ชายโครงด้านขวา



มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก
อาการตับอักเสบ



มีอาการผื่นแดง ตุ่มแดง

ซึ่งมักจะพบได้บ่อยในช่วงที่ไข้ลงแล้ว

อาการ แบ่งเป็น 3 ระยะ

- **ระยะมีไข้** ไข้สูงลอย 2-3 วัน ทานยาไม่ลด ปวดศีรษะ ชีบ หน้าแดง ปวดท้อง มีผื่น
- **ระยะช็อกและมีเลือดออก** ช่วงวันที่ 3-7 วันของโรค ไข้ลด อาการทรุดหนัก ปวดท้องอาเจียน ถ่ายเป็นเลือด เลือดกำเดาไหล อาจทำให้เสียชีวิตได้
- **ระยะฟื้นตัว** อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเริ่มอยากกินอาหาร มีผื่นของการหายที่เป็นแดงสลับขาวแผ่ตามแขนขา

การรักษา

ไม่มียาเฉพาะรักษาตามอาการพยายามให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือเกลือแร่มากๆถ้ามีความสงสัยว่าไข้ยังสูง มีตัวแดง เกิดในหน้าผนต้องรีบนำไปตรวจเพิ่มทันที

อาการอันตรายเมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ ต้องรีบนำไปส่งโรงพยาบาล

- ผู้ป่วยซึม หรืออ่อนเพลียมาก ตื่นน้ำหรือรับประทานอาหารได้น้อยลง
- คลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลา
- ปวดท้องมาก
- มีเลือดออก เช่น เลือดกำเดา อาเจียนหรือถ่ายอุจระเป็นเลือดหรือเป็นสีดำ
- กระสับกระส่าย หงุดหงิด
- พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติ
- ร้องกวนตลอดเวลาในเด็กเล็ก
- กระจายน้ำตาลตลอดเวลา
- ตัวขึ้น สีผิวคล้ำลง หรือตัวลายๆ
- ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ถ่ายปัสสาวะเป็นเวลานาน

*** ไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถ้าอาการไม่ดีควรรีบไปพบแพทย์ทันที ***

การปฏิบัติตัว

1. ไข้สูง ปวดศีรษะ เพื่้ออาหาร ไม่มีเลือดออกให้พักผ่อนมากๆ
2. เมื่อมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ ทานยาลดไข้
3. ทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
4. ดื่มน้ำ น้ำผลไม้ หรือเกลือแร่ให้มากๆ
5. สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เมื่อพบว่ามีอาการอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

การป้องกัน

1.การป้องกันไม่ให้ยุงกัด

- การนอน ควรนอนในมุ้งหรือในห้องติดมุ้งลวดที่ปลอดยุงลาย
- การเล่น ไม่ควรเล่นในมุ้งมิดหรือบริเวณที่ไม่มีลมพัดผ่าน
- ห้องเรียนหรือห้องทำงาน ควรมีแสงสว่างส่องได้ทั่วถึง มีพัดลมผ่านได้สะดวก และไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

2.กำจัดยุง

- ด้วยการพ่นสารเคมีในบริเวณที่มีมดุมยุง เช่น ตู้เสื้อผ้าและบริเวณรอบบ้านทุกสัปดาห์
- กำจัดลูกน้ำ ภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิด ถ้าไม่สามารถปิดได้ ให้ใส่ทรายอะเบท หรือใส่ปลาหางนกยูง จานรองขาตู้กับข้าวใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก
- ใส่ทรายลงไปเพื่ออุดขังน้ำส่วนเกิน ในจานรองกระถางต้นไม้ หรือแอ่งน้ำ

3.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

วัสดุที่เหลือใช้รอบๆบ้าน เช่น กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าๆฯ ให้เผาหรือทำลายเสีย